

**BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI**  
**TỜ THÔNG TIN THUỐC**

**THÔNG TIN THUỐC**  
**BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 1 – 2019**

**Kính gửi :**

- Các Khoa, Phòng;
- Bệnh nhân La Thị Diệu Hằng

**Bệnh nhân hỏi: uống thuốc Rotundin dài ngày có tác dụng phụ không?**

**Trả lời:**

Rotundin là một dược chất được chiết xuất từ cây Bình vôi tên khoa học *Stephania Rotunda Menispermaceae*, đây một dược thảo mọc ở các vùng núi cao của Trung Á và Châu Âu như Nga, Trung Quốc, Rumani và Việt Nam. Đã từ lâu Rotundin được sử dụng làm thuốc an thần và giảm đau dưới dạng bột, thuốc viên, thuốc tiêm và được ghi trong dược điển một số nước. Ngoài tác dụng an thần giảm đau, Rotundin còn có tác dụng điều hòa nhịp tim, hạ huyết áp, giãn cơ trơn do đó giảm các cơn đau do co thắt ở đường ruột và tử cung. Theo nguồn : Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất như sau:

**Dạng bào chế:** Viên nén

1. **Đóng gói:** Hộp 10 vỉ x 10 viên

2. **Thành phần:** Rotundin

3. **Hàm lượng:** 60mg

4. **Chỉ định:**

- An thần, gây ngủ.

- Giảm đau trong các trường hợp đau do co thắt ở đường tiêu hóa, tử cung, đau

dây thần kinh, đau đầu.

5. **Chống chỉ định:**

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Người đang vận hành tàu xe, máy móc, người trầm cảm.

- Mẫn cảm với Tetrahydropalmitin (thành phần khác của cây bình vôi).

- Trẻ em dưới 1 tuổi.

6. **Liều dùng và cách dùng:**

Liều dùng tùy thuộc vào từng bệnh.

- Người lớn:

+ An thần, gây ngủ: Uống 1-2 viên trước khi đi ngủ.



+ Giảm đau trong các bệnh đường tiêu hóa, đau khi có kinh, đau đầu: Uống 2-4 viên chia 2 lần mỗi ngày.

- Trẻ em trên 1 tuổi: 2mg/kg cân nặng, chia 2-3 lần/ngày.
- Hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

**7. Phản ứng phụ:**

- Hiếm khi thấy tình trạng chóng mặt hoặc biểu hiện dị ứng khi dùng thuốc.
- Hiếm gặp: Xuất hiện tình trạng thao cuồng, hoang tưởng.
- Nhịp tim chậm, hạ huyết áp, suy hô hấp, ngủ lịm, mất phương hướng khi quá liều.

**8. Thận trọng**

- Ngừng thuốc trong trường hợp có biểu hiện, dị ứng chóng mặt.
- Không dùng đồng thời với các thuốc an thần khác hay thuốc ức chế thần kinh trung ương khác.

**9. Tương tác thuốc**

Chưa có báo cáo nào về tương tác của Rotundin với các thuốc khác hay dạng tương tác khác.

**10. Quá liều**

Rotundin rất an toàn cho người sử dụng, tuy nhiên việc uống quá liều Rotundin có thể gây rối loạn tim mạch, nhịp tim chậm hoặc nhanh, rối loạn điện tim.

**11 Xử trí:**

Nguyên tắc điều trị là điều trị triệu chứng và hỗ trợ, không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị triệu chứng: Sử dụng than hoạt để hấp thụ.

**Tài liệu tham khảo:**

- Tờ hướng dẫn sử dụng của Nhà sản xuất.

Thừa Thiên Huế, ngày 8 tháng 8 năm 2019

**DUYỆT GIÁM ĐỐC,**

**TM. TÔ THÔNG TIN THUỐC**



**Ds Hoàng Quốc Khanh**

**Lê Thanh Hải**